

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

DLP 24-5-65 38538

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION de la STATION de BORDEAUX (Tél. 92-26-94)

ABONNEMENT ANNUEL  
15 NF

(GIRONDE, DORDOGNE, LOT-&-GARONNE, LANDES,  
BASSES-PYRÉNÉES, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, Chemin d'Artigues, CENON (Gironde)  
C. C. P. : BORDEAUX 6707-65

Supplément N° 2 au Bulletin Technique N° 56 de Mai 1965

I965-I4

## AVERTISSEMENTS

### VIGNE

Black-Rot : Les Périthèces pouvant encore provoquer des contaminations primaires et les premières taches venant d'apparaître, il convient de continuer la protection des vignes se trouvant dans les zones contaminées par la maladie ou situées à proximité de parcelles incultes.

Mildiou : Les températures basses, d'avril, puis le temps chaud et sec du début de Mai ont contrarié l'évolution des oeufs d'hiver.

Les risques de contamination ont donc diminué et les premiers foyers qui apparaîtront seront vraisemblablement localisés.

En raison de la végétation rapide un traitement pourrait tout de même être appliqué dans les vignes qui n'ont pas encore été traitées.

## INFORMATIONS

Anomalies de développement de la vigne : On nous signale dans de jeunes plantations une végétation anormale sur de nombreux pieds. L'aspect rabougri des pousses fait penser à des dégâts d'Acariose, mais nous avons constaté qu'il s'agissait souvent de Thyllose.

Avant d'appliquer un traitement acaricide souvent inutile, nous conseillons aux viticulteurs de s'assurer d'abord de la présence des Acariens.

## AVERTISSEMENTS

### ARBRES FRUITIERS

Tavelures des Poiriers et des Pommiers : Pour prévenir les nouvelles contaminations de Tavelures effectuer un nouveau traitement dès à présent.

Carpocapse des Pommes et des Poires : L'évolution du Carpocapse est déjà commencée depuis plusieurs jours.

Pour éviter les premières attaques un insecticide pourrait être ajouté à la bouillie préconisée contre les Tavelures.

Tordeuse Orientale du Pêcher : Des attaques de Tordeuse Orientale peuvent avoir lieu sur les pousses des jeunes sujets de pépinières ou sur des arbres en formation. Pour les éviter on pourra appliquer, dès à présent, un insecticide.

Cochenille du Mûrier : Dans le Bulletin Technique N° 54 de Mars sur les Cochenilles nous indiquions que la destruction des larves devrait être envisagée dans le courant du mois de Mai.

Actuellement, les éclosions sont presque terminées. Il convient donc de prévoir l'application d'un Oléoparathion à 3% de Parathion à la dose de 0,6% dans la semaine du 24 au 29 mai.

P167 .../...

INFORMATIONS

ARBRES FRUITIERS

Tavelure du Pêcher : Dans les vergers habituellement envahis renouveler le traitement préconisé par notre Bulletin N° 10 du 15 avril 1965.

Rouille du Prunier : Pour prévenir les attaques de Rouille sur les Pruniers on pourra utiliser une Bouillie bordelaise à 1% ou une spécialité à base de Zinèbe ou de Zirame.

POMME DE TERRE

Mildiou : Des foyers ont été découverts dans les cultures de primeurs de la région bordelaise et du Lot et Garonne.

Pour éviter leur extension et protéger les cultures où les plantes sont déjà bien développées, il convient de prévoir un traitement dès à présent.

Bordeaux, le 22 Mai 1965

Le Contrôleur  
chargé des Avertissements  
C. ROUSSEL

L'Inspecteur  
de la Protection des Végétaux  
J. BRUNETEAU